

**Тест по 1-дисциплине**

1. Удобрение, относящееся к группе органических, применяемое в лесокультурном деле:
  - A) компост
  - B) нитрагин
  - C) суперфосфат
  - D) аммиачная селитра
  - E) аммофос
  
2. Тип смешения лесных культур, произрастающих в островных сосновых борах Костанайской области:
  - A) пихтовый
  - B) саксауловый
  - C) лиственный
  - D) кустарниковый
  - E) сосновый
  
3. Культура, имеющая низкий срок окупаемости:
  - A) липа
  - B) сосна
  - C) дуб
  - D) тополь
  - E) ель
  
4. Чистые культуры - это культуры, состоящие из:
  - A) нескольких хвойных видов
  - B) двух видов
  - C) кустарниковых и древесных видов
  - D) одного вида растения
  - E) смешанных видов
  
5. Показатели стандартных сеянцев лесных культур определяются по следующим показателям:
  - A) по листовым пластинкам и хвое
  - B) по текущему приросту
  - C) по внешнему виду ствола и кроны
  - D) по длине стержневого корня
  - E) по высоте и диаметру корневой шейки

6. Участки первоочередного освоения под лесные культуры:

- А) старая вырубка
- В) целинная степь
- С) 15-ти летняя вырубка
- Д) многолетняя залежь
- Е) свежая гарь

7. Районирование Казахстана наиболее приемлемое для лесокультурных целей:

\_\_\_\_\_ районирование

- А) дендрологическое
- В) агромелиоративное
- С) лесорастительное
- Д) природное
- Е) геоботаническое

8. Количество семян, требуемое при создании двурядных культур полосами шириной 2,8м с межполосным пространством 4,2м и расстоянием в ряду между сеянцами 0,5м:

- А) 13333 шт
- В) 5720 шт
- С) 6820 шт
- Д) 3333 шт
- Е) 8200 шт

9. Метод, применяемый на участках, занятых малоценными насаждениями:

- А) дополнение
- В) лесоразведение
- С) инвентаризация
- Д) лесовозобновление
- Е) реконструкция

10. Наиболее эффективная система обработки для подавления корневищных сорняков:

- А) весновспашка с закрытием влаги
- В) занятой пар с дискованием почвы
- С) сидеральный пар с внесением суперфосфатов
- Д) зяблевая вспашка с внесением микоризной почвы
- Е) ранний пар с 4-5 культивациями